




Agrenda B3|25
ΕΙΔΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 1 & ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΝΤΟΜΑΤΑ

■ **ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ** ΝΤΟΜΑΤΑΣ
(ΤΟΝΟΙ/ΣΤΡΕΜΜΑ)



Για όψη, γλυκάδα και αντοχή

Μόνο μια επιτραπέζια ντομάτα με υψηλή διατηρησιμότητα, εντυπωσιακή όψη και γλυκάδα στη γεύση μπορεί να διεκδικήσει υπεραξία, καθώς το τιμολογιακό χάσμα μεταξύ α' και β' κατηγορίας βαίνει τα τελευταία χρόνια αυξανόμενο. Το κυνήγι της ποιότητας μέσω ενός ολοκληρωμένου προγράμματος θρέψης δημιουργεί υποθήκη για βελτιστοποίηση των κερδών. Αυτό δεν σημαίνει πως ο παραγωγός δεν θα πρέπει να έχει μόνιμα στραμμένη την προσοχή του στους καλλιεργητικούς εχθρούς, οι οποίοι, λόγω της εντεινόμενης κλιματικής αλλαγής απασχολούν όλο και συχνότερα τις ντοματοφυτείες.

Το Νέο Εργαλείο για τη διαχείριση της *Tuta absoluta* στην Τομάτα

Γιατί να επιλέξω το AZATIN EC;

- ★ Έχει μικρό PHI (τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή).
- ★ Έχει έγκριση σε πολλές καλλιέργειες και για διαφορετικά είδη εντόμων.
- ★ Έχει δευτερεύουσα δράση κατά των ακάρεων.
- ★ Αποτελεί άριστο εργαλείο για τη διαχείριση της ανθεκτικότητας των εντόμων.
- ★ Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε Προγράμματα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης.
- ★ Κατάλληλο για χρήση στη βιολογική γεωργία σύμφωνα με τους Καν. (ΕΕ) 2021/1165 και Καν.(ΕΕ) 2018/848, όπως κάθε φορά ισχύουν.

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ): 14617/ 30.06.2017
Δραστική ουσία: azadirachtin A 2,6% β/ο

Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάσετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.

AZATIN® EC

Θα σας
μαγέψει!

 **K&NE** Καλλιεργούμε αξία
EARTH MATTERS Δημιουργούμε φυτοπροστασία

K&N ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Μ.ΑΒΕΕ
Κεντρικά Γραφεία Θεσσαλονίκης: Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης, Τ.Θ. 48, Τ.Κ. 570 22 Σίνδος, Θεσσαλονίκη.
Τηλ. 2310 568656, Φαξ 2310 798423, E-mail: info@efthymiadis.gr. Διεύθυνση Νοτίου Ελλάδος: 1ο χλμ. Ολυμπιακού
Σκοπευτηρίου, Τ.Θ. 13, Τ.Κ. 190 03, Μοκκόπουλο Αττικής. Τηλ. 22990 63830/63840, Φαξ 22990 63346, E-mail: info@efthymiadis.gr
www.efthymiadis.gr  K&N Efthymiadis

ΑΓΟΡΑ

ΣΤΟ 1,50 ΕΥΡΩ
ΤΟ ΠΑΣΧΑ Η ΤΙΜΗ
ΤΗΣ ΝΤΟΜΑΤΑΣ

Ασφαλές καταφύγιο για τη θερμοκηπιακή ντομάτα αποτελούν τα 1,40 - 1,50 ευρώ το κιλό κατά την περίοδο του Πάσχα, τιμή η οποία ικανοποιεί τους παραγωγούς αφήνοντας ένα σεβαστό περιθώριο κέρδους, ευνοεί την ευρεία κατανάλωση κρατώντας τις τιμές λιανικής σε αποδεκτά επίπεδα και δεν δημιουργεί αρκετά κίνητρα στο εμπόριο να ψαχτεί για μαζικές εισαγωγές από τις γειτονικές βολκανικές χώρες. Σύμφωνα με τα όσα εξηγεί στην Agrenda ο Νίκος Τριανταφυλλόπουλος, υπεύθυνος πωλήσεων στον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ανατολή, τις τελευταίες μέρες καταγράφεται μία άνοδο της τιμής παραγωγού στα επίπεδα του 1,20 με 1,30 ευρώ το κιλό, ενώ με δύο εβδομάδες να απομένουν για το ορθόδοξο Πάσχα, τόσο η ζήτηση όσο και οι τιμές θα συνεχίσουν την ανοδική τους πορεία. Η φετινή σεζόν μπορεί να μην έχει ως τώρα ικανοποιήσει ιδιαίτερα τους καλλιεργητές, ωστόσο ένας καλός Απρίλιος είναι αρκετός για να επαναφέρει κάποια χαμόγελα στις τάξεις των παραγωγών στα κρητικά θερμοκήπια, αφού ένα μεγάλο μέρος της ετήσιας προσόδου βγαίνει παραδοσιακά την αμέσως επόμενη περίοδο. Παρόμοια κατάσταση επικράτησε και πέρυσι, όταν οι τιμές άρχισαν να τσιμπούν μερικά λεπτά κάθε μέρα από το τελευταίο 10ήμερο του Μαρτίου.



■ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΘΡΕΨΗΣ (ΚΙΛΑ / ΣΤΡΕΜΜΑ)

	N ΑΖΩΤΟ	P ΦΩΣΦΟΡΟΣ	K ΚΑΛΙΟ	Mg ΜΑΓΝΗΣΙΟ	Ca ΑΣΒΕΣΤΙΟ
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΝΤΟΜΑΤΑ	25-40	10-20	25-50	4-10	9-35
ΝΤΟΜΑΤΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ	30-45	10-25	25-70	4-12	9-35

ΕΩΣ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΑΞΙΑΝΘΙΑ
ΥΨΗΛΕΣ ΟΙ ΘΡΕΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

> **Το άζωτο βοηθά** στη βλαστική ανάπτυξη και ο φώσφορος δίνει ομοιόμορφο χρώμα στον καρπό

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΡΟΥΠΙΑ

Αυξημένες και διαφορετικές εν συγκρίσει με τα υπόλοιπα κηπευτικά (π.χ. μελιζάνες, πιπεριές) είναι οι απαιτήσεις της ντομάτας (τόσο θερμοκηπιακής όσο και υπαίθριας) σε λίπανση. Η καλλιέργεια έχει σημαντικές ανάγκες σε λίπανση -υψηλότερες στην περίπτωση της θερμοκηπιακής καλλιέργειας- για να αποδώσει πλούσια καρποφορία και ζυμερούς, γλυκούς καρπούς. Πρέπει να επισημανθεί πως οι ντοματιές είναι εξίσου ευαίσθητες και στο πλεονάζον λίπασμα. Τα συμπτώματα της υπερβολής στο άζωτο περιλαμβάνουν αύξηση της ευαισθησίας στους παθογόνους μικροοργανισμούς, μείωση της παραγωγής λόγω παράτασης της άνθισης, οψίμηση της ωρίμανσης και επιπλέον μαλάκωμα των καρπών. Ο βιολογικός κύκλος της καλλιέργειας διακρίνεται σε 4 περιόδους με διαφορετικές ανάγκες σε θρεπτικά συστατικά. Κατά την πρώτη περίοδο, από τη φύτευση μέχρι το δέσιμο του πρώτου σταυρού η συνολική ζήτηση είναι μικρή. Ακολουθεί η περίοδος μετά και μέχρι τον σχηματισμό της τελευταίας ταξιανθίας όπου οι ανάγκες για άζωτο, φώσφορο και κάλιο είναι αυξημένες. Ακολούθως και μέχρι το 85% της ανάπτυξης, σε περίπου 5 εβδομάδες, η ζήτηση για κάλιο είναι μικρή, κανονική για τον φωσφόρο και μεγάλη για άζωτο, ασβέστιο και μαγνήσιο. Λίγες βδομάδες μετά σταματά η δημιουργία ξηρής μάζας άρα και η έντονη ζήτηση για θρεπτικά στοιχεία. Μόνο ο φωσφόρος απορροφάται σε λογικά επίπεδα αν και συνήθως προσφέρεται ασβέστιο που ενισχύει τη μετασυλλεκτική διατηρησιμότητα. Λεπτή ισορροπία για αποφυγή τροφοπενίας Η ντομάτα αποτελεί μία ιδιαίτερα καλιόφιλη καλλιέργεια,

με το στοιχείο να παίζει σημαντικό ρόλο σε πολλές μεταβολικές και καρποδοτικές λειτουργίες του φυτού. Η προσθήκη μεγαλύτερων ποσοτήτων καλίου δίκως όμως υπερβολές βελτιώνει κατά πολύ την ποιότητα, το σχήμα, τη συνεκτικότητα και την ομοιομορφία στο χρώμα του καρπού. Η έλλειψη του καλίου εμφανίζεται συνήθως με περιφερειακή χλώρωση και νέκρωση των φύλλων, ξεκινώντας από τα φύλλα της βάσης, ενώ προκαλεί ανομοιόμορφη εμφάνιση χρώματος στους ώριμους καρπούς. Η υπερβολική όμως καλιούχος λίπανση συχνά προκαλεί τροφοπενία μαγνησίου στην τομάτα, λόγω ανταγωνισμού των δύο θρεπτικών στοιχείων. Χτίσιμο της ντοματιάς με άζωτο και φώσφορο Όσον αφορά τα άλλα δύο θεμελιώδη στοιχεία κάθε προγράμματος θρέψης, το άζωτο έχει σημαντική επίδραση στη βλαστική ανάπτυξη και την αγρονομική απόδοση του φυτού, ενώ ο φώσφορος επηρεάζει δομικά την καλλιέργεια. Από τη μία βοηθάει στην καλύτερη ανάπτυξη του ριζικού συστήματος και την ομοιόμορφη ανάπτυξη του χρώματος του καρπού κατά την ωρίμανση, από την άλλη όμως, τυχόν υπερβολή με τον φώσφορο προκαλεί ανομοιόμορφο χρωματισμό των καρπών και ποιοτική υποβάθμισή τους (αύξηση των κενών χώρων στο εσωτερικό του καρπού, μείωση οξύτητας). Η έλλειψη φωσφόρου γίνεται εύκολα αντιληπτή στο χωράφι/θερμοκήπιο από τον μωβ χρωματισμό στην κάτω επιφάνεια των φύλλων. Η χορήγηση των θρεπτικών στοιχείων αζώτου και καλίου πρέπει να επιμερίζεται κατά τη διάρκεια του βλαστικού κύκλου. Επίσης, στην καλλιέργεια υπαίθριας καλλιέργειας ντομάτας, όλη η ποσότητα του φωσφόρου χορηγείται εφ' άπαξ στην αρχή της καλλιέργειας μέσω της βασικής λίπανσης.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΥΤΑ ABSOLUTA

> **Καινοτόμα** εντομοκτόνα από την K&N ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Μ.ΑΒΕΕ

Η K&N ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Μ.ΑΒΕΕ εξειδικεύεται στην πρόληψη και τον έλεγχο εχθρών και παθογόνων που επηρεάζουν διαφορετικές καλλιέργειες. Τα προϊόντα της έχουν σχεδιαστεί για να προάγουν τη βιωσιμότητα, τη φροντίδα του περιβάλλοντος και του εδάφους, ενώ ταυτόχρονα αποτελούν ένα εξαιρετικό εργαλείο για την εξάλειψη των διαφόρων εχθρών και παθογόνων που μπορεί να προσβάλλουν τις καλλιέργειες. Για τον έλεγχο της *Tuta Absoluta* στην τομάτα η K&N ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Μ.ΑΒΕΕ προτείνει τα βιοδραστικά εντομοκτόνα AZATIN EC και COSTAR WG:

■ **AZATIN EC:** εντομοκτόνο επαφής και στομάχου με δισυστηματική δράση,

περιέχει ως δραστική ουσία εκχύλισμα από τους σπόρους του τροπικού φυτού *Azadirachta indica* (azadirachtin A 2,6% β/ο). Ως προς τον τρόπο δράσης του παρεμβαίνει στην εξέλιξη των στελών σταδίων και αναστέλλει τις κυτταρικές λειτουργίες των εντόμων, έχει αντιτροφικές και εντομοσπαωθητικές ιδιότητες, ενώ επίσης προκαλεί μείωση της γονιμότητας των εντόμων- στόχων. Το AZATIN είναι ήπιο ως προς τα κύρια ωφέλιμα έντομα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε Προγράμματα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης και στη Βιολογική Γεωργία (σύμφωνα με τους Καν. (ΕΕ) 2021/1165 και Καν.(ΕΕ) 2018/848, όπως κάθε φορά ισχύουν).

■ **COSTAR WG:** Νέο εντομοκτόνο που

αποτελείται από *Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki* strain SA-12 85% β/β που ισοδυναμεί με 8.5×1012CFU, 90000 IU/mg σε ενεργό πρωτεΐνη δ-επδοτοκίνη 18%, που τον καθιστά τον πιο πυκνό εγκεκριμένο βάκιλλο. Είναι αποτελεσματικός στον έλεγχο της *Tuta Absoluta*, καθώς ενάντια και σε άλλες προνύμφες λεπιδοπτέρων. Είναι ένα επιλεκτικό εντομοκτόνο που δρα με κατάποση στις προνύμφες των πρώτων σταδίων ανάπτυξης. Το COSTAR δεν έχει καμία επίδραση στα ωφέλιμα έντομα, καθιστώντας το ένα εξαιρετικό εργαλείο για τους αγρότες που εφαρμόζουν Πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης. Το COSTAR επιτρέπεται για χρήση στη Βιολογική Γεωργία, σύμφωνα με



τους Καν. (ΕΕ) 2021/1165 και Καν.(ΕΕ) 2018/848, όπως κάθε φορά ισχύουν.

Γιάννης Σμυρνάκης, Υπεύθυνος
Ανάπτυξης Καλλιεργειών,
Τεχνικής Υποστήριξης &
Marketing - Πατάτες, Κηπευτικά

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ COMPO EXPERT

> **Κλειδί για υψηλές αποδόσεις** οι εφαρμογές στα κρίσιμα στάδια της καλλιέργειας τομάτας

Η εφαρμογή του σωστού λιπάσματος, στις σωστές δόσεις και τη σωστή στιγμή είναι το κλειδί για υψηλές αποδόσεις στην καλλιέργεια τομάτας. Η COMPO EXPERT συνιστά το παρακάτω πλήρες πρόγραμμα λίπανσης:

Στάδιο 1 από την μεταφύτευση μέχρι την έναρξη καρπόδεσης (4ος με 5ος σταυρός)
Συνιστάται εφαρμογή με Basaplant® Starter. Το Basaplant® Starter είναι ένα υδατοδιαλυτό σύνθετο λίπασμα NPK 13-36-13 με μικροθρεπτικά συστατικά, τύπος που ενδείκνυται για την έναρξη της καλλιέργειας.

Στάδιο 2 από έναρξη καρπόδεσης (4ος με 5ος σταυρός) μέχρι έναρξης ωρίμανσης
Τα προτεινόμενα προϊόντα είναι Complestal® Solub 20-19-19 +TE ή Complestal® Drip 20-20-20. Στόχος να υπάρξει η ισορροπία μεταξύ της βλαστικής και της αναπαραγωγικής φάσης και να τροφοδοτήσουμε το φυτό με όλα τα απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία με σκοπό να καλυφθούν οι υψηλές του ανάγκες λόγω του υψηλού ρυθμού ανάπτυξης. Το Complestal® Solub 20-19-19 +TE είναι ένα υδατοδιαλυτό NPK

λίπασμα πλούσιο σε ικνoστοιχεία, το οποίο ενισχύει την καλλιέργεια στις φάσεις υψηλής δραστηριότητας. Από την άλλη πλευρά το νέο προϊόν, της COMPO EXPERT, Complestal® Drip 20-20-20 το οποίο είναι ειδικά σχεδιασμένο για τις ιδιαίτερες κλιματικές και εδαφικές συνθήκες της Ελλάδας, είναι ένα ισόρροπο κρυσταλλικό λίπασμα, με εδαφικό σίδηρο EDDHA, για μέγιστη διαθεσιμότητα σε εδάφη με υψηλό pH.

Στάδιο 3 από έναρξη ωρίμανσης μέχρι τέλος συγκομιδής
Συστήνονται τα υδατοδιαλυτά σύνθετα λιπάσματα Basaplant® Orange ή Complestal® Drip 10-5-35, πλούσια σε κάλιο και μικροθρεπτικά συστατικά. Φόρμουλες που συνιστώνται για τα στάδια αυξημένων αναγκών σε κάλιο, από την καρπόδεση έως την συγκομιδή. Στις περιπτώσεις

που ο παράγωγος θέλει να συνδυάσει τον εφοδιασμό του φυτού με κάλιο και ασβέστιο συνιστάται η εφαρμογή του Hakaphos® Calcidic Plus K 14-5-24 (+10 CaO), το οποίο παρά την παρουσία 10 μονάδων ασβεστίου έχει πολύ χαμηλό, όξινο pH.

Ειδική θρέψη – Εδαφοβελτίωση (υδρολίπανση)
Κατά την διάρκεια του δεύτερου ποτίσματος από την μεταφύτευση και για 2 με 3 επαναλήψεις προτείνεται η εφαρμογή υδρολίπανσης με Vitanica® RZ. Το Vitanica® RZ είναι ένα υγρό οργανο-ανόργανο λίπασμα NK το οποίο περιέχει εκχύλισμα φυκιών από το Ecklonia maxima που παρέχει βιοδραστικά οργανικά συστατικά (αμινοξέα, βιταμίνες) στο φυτό. Με την δράση του *Bacillus amyloliquefaciens* το Vitanica® RZ έχει μια διεγερτική επίδραση στην ανάπτυξη των ριζών και υποστηρίζει τη ζωτικότητα και την αντοχή στο στρες. Καθ'όλη την περίοδο της καλλιέργειας συνιστώνται εφαρμογές με Complestal® Black και Basfoliar® Triple Flo. Με το Complestal® Black το οποίο είναι υγρό λίπασμα χουμικών (7,5%) και φουλβικών (7,5%) οξέων αρίστης διαλυτότητας, επιτυγχάνεται βελτίωση της σύστασης του εδάφους ενώ ταυτόχρονα αυξάνεται και η

απορρόφηση των ανόργανων στοιχείων. **Ειδική θρέψη (διαφυλλικές εφαρμογές)**
Από την έναρξη της ανθοφορίας και ανά 15 με 20 ημέρες προτείνεται διαφυλλική εφαρμογή με συνδυασμό του Basfoliar® Kelp O SL και TerraPlus® Ca Fluid, για να επιτευχθεί ομοιόμορφη καρπόδεση, μέγεθος καρπού, μετασυλλεκτική συντήρηση, αλλά και για αντοχή σε αβιοτικά στρες (παγετός, καύσωνας).. Την ίδια στιγμή ο βιοδιεγέρτης Basfoliar® Kelp O SL με εκχύλισμα από το φύκος *Ecklonia maxima*, το οποίο περιέχει φυτορμόνες, πρωτεΐνες και αμινοξέα θα ενισχύσει την ανάπτυξη της ρίζας και θα προσφέρει σταθερότητα στο φυτό έναντι του stress. Από την έναρξη της ωρίμανσης μέχρι το τέλος της συγκομιδής προτείνεται διαφυλλική εφαρμογή με τον καινοτόμο βιοδιεγέρτη Basfoliar® Plantae Bio SL, ώστε να επιτευχθεί ομοιομορφία χρώματος και μεγέθους. Σε όλη την διάρκεια της καλλιέργειας και αναλόγως με τις συνθήκες και τις ανάγκες η COMPO EXPERT συνιστά την διαφυλλική εφαρμογή με το Basfoliar® Triple Flo, ενός πυκνού εναιωρήματος που εφοδιάζει το φυτό με τα ικνoστοιχεία (5% Cu, 12% Mn, 18% Zn).

Φώτης Τυρογαλάς
Γεωπόνος COMPO EXPERT





Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΕΝΤΟΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΕΣ ΙΩΣΕΙΣ

> Συνέδριο Syngenta για τους τρόπους διαχείρισης των εντόμων και των ιών στα κηπευτικά

syngenta

Οι ιώσεις που μεταδίδονται από έντομα αποτελούν τις σημαντικότερες απειλές για όλες τις καλλιέργειες των κηπευτικών. Η Syngenta Hellas, με γνώμονα τη συνεχή ενημέρωση και παροχή ολοκληρωμένων λύσεων, διοργάνωσε στις 18 Μαρτίου 2023, στο Ηράκλειο Κρήτης, ένα συνέδριο με θέμα «Προστασία των κηπευτικών από έντομο-μεταδιδόμενες ιώσεις». Στο συνέδριο συμμετείχαν κορυφαίοι επιστήμονες και ακαδημαϊκοί, οι οποίοι μίλησαν για τη διαχείριση των μυζητικών εντόμων και ιώσεων.

Πιο συγκεκριμένα ο κύριος Ροδιτάκης Ε. - Καθηγητής Γ. Εντομολογίας & Φαρμακολογίας ΕΛΜΕΠΑ στο Τμήμα Γεωπονίας, σε συνεργασία με τον κύριο Βόντα Γ. - Καθηγητής Γ. Φαρμακολογίας, ΓΠΑ, ΙΤΕ, Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας, παρουσίασαν τους «Τρόπους Διαχείρισης των Μυζητικών Εντόμων, στα πλαίσια της Πράσινης Συμφωνίας, στις καλλιέργειες των Κηπευτικών». Ακολούθησε η παρουσίαση του κύριου Κατή Ν. - Καθηγητή Ιολογίας στο ΑΠΘ - Τμήμα Γεωπονίας με θέμα «Σημαντικότερες



Ιολογικές Ασθένειες και τρόποι Αντιμετώπισή τους». Επιπλέον έγινε ανάλυση του Σύγχρονου Περιβάλλοντος της Φυτοπροστασίας και στις προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει η Ελληνική γεωργία στο κοντινό μέλλον από τον κύριο Ποντίκα Γ. - Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της Syngenta Hellas και τον κύριο Οικονομίδη Κ. - CP Marketing & Technical Head Mediterranean της Syngenta Hellas. Ενώ παρουσιάστηκαν στους συμμετέχοντες τα αποτελέσματα των πειραμάτων που διενεργήθηκαν μέσα



από την συνεργασία της Syngenta Hellas με τα Ελληνικά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα. Πιο συγκεκριμένα παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της υψηλής και ταυτόχρονης προστασίας που προσφέρει το Minecto Alpha 10/1,25 SC από ιούς λόγω της πολύ υψηλής συνεργίας εντομοκτόνου δράσης και ενεργοποίησης των φυσικών μηχανισμών άμυνας των φυτών. Και του Clavitus 13SL το οποίο αποτελεί το πρώτο βιολογικό εντομοκτόνο που προσφέρει υψηλή προστασία από μυζητικά έντομα και τετράνυχους, έχοντας υψηλή



συμβατότητα με τα περισσότερα ωφέλιμα έντομα και επικονιαστές. Ο στόχος της Syngenta είναι να βρίσκεται μπροστά από τις εξελίξεις, με επιστημονική γνώση προσφέροντας λύσεις στο δυναμικό περιβάλλον της σύγχρονης γεωργίας. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους τους συμμετέχοντες για την ενεργή παρουσία τους και την άποψη συνεργασία.

Δελημπαλαδάκης Μανώλης
Campaign Manager
Κηπευτικών καλλιεργειών

Ο νέος πρωταγωνιστής στον περονόσπορο

Orondis® Ultra 3/25 SC

www.syngenta.gr
Ακολουθήστε μας: [f](https://www.facebook.com/syngentahellas) [i](https://www.instagram.com/syngentahellas) [@syngentahellas](https://www.twitter.com/syngentahellas)

Syngenta Hellas
Μονοπρόσωπη Α.Ε.Β.Ε.
Ανθούσα Αττικής, ΤΚ 153 49
τηλ. 210 66 66 612-3
ΒΙ.Π.Ε.Θ., Σίνδος, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2310 796 940-3



nemaT@QOL

by Bayer

+

BioAct[®] PRIME



Η ολιστική προσέγγιση στη σύγχρονη νηματωδοκτονία

- ✓ Βέλτιστη & αποτελεσματική εφαρμογή του **BioAct Prime**
- ✓ Παρακολούθηση & βελτιστοποίηση της **Ηλιοαπολύμανσης**
- ✓ Εξοικονόμηση φυσικών πόρων & συντήρηση του εδάφους



Bayer Ελλάς ABEE
Τομέας Επιστήμης Γεωργίας
Σωρού 18-20, 15125 Μαρούσι
Τ: 210 6166000

www.cropscience.bayer.gr

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ.
Πριν τη χρήση διαβάστε τις προειδοποιητικές φράσεις
και τα σύμβολα που αναγράφονται στην ετικέτα.

ΤΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ
ΜΕ ΑΣΦΑΛΗ ΤΡΟΠΟ. ΝΑ ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΠΑΝΤΑ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ.