

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ
ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ & ΦΥΤΟΪΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ταχ. Δ/ση: Καστοριάς 32Α, 71307 Ηράκλειο

Τηλ: 2810.224948, Fax: 2810.225616

Email: pkpfiraklio@minagric.gr

Τα δελτία αναρτώνται στην ιστοσελίδα του υπουργείου
www.minagric.gr και αποστέλλονται μέσω e-mail σε κάθε
ενδιαφερόμενο με αίτημα στο agrodeltiokriti@gmail.com



Εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης των φαρμάκων.
Έτσι προστατεύετε εσείς, ο καταναλωτής και το περιβάλλον.

ΕΧΘΡΟΙ και ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΙΟΥ Δελτίο Ν° 24

ΕΥΔΕΜΙΔΑ: (*Lobesia botrana*)

Γενικές πληροφορίες - Διαπιστώσεις:

1. Τις τελευταίες ημέρες καταγράφεται μια αύξηση των συλλήψεων στις φερομονικές παγίδες φύλου σε όλες τις ζώνες παρακολούθησης του εντόμου (πρώιμη, μεσοπρώιμη, όψιμη).
2. Υπάρχουν αρκετά αμπέλια, κυρίως στην όψιμη αλλά και στη μεσοπρώιμη ζώνη, όπου ο τρύγος καθυστερεί.



Οδηγίες:

- ❖ Για όλους τους παραπάνω λόγους στα σταφύλια με όριο ανοχής προσβολών πολύ μικρό έως μηδενικό που θα συγκομιστούν μετά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου συνιστάται αντιμετώπιση.
- Ενδεικτικές ημερομηνίες αντιμετώπισης : **8 - 10 Σεπτεμβρίου**
- Σε αμπέλια για επιτραπέζια χρήση περιοχών με ιστορικό προσβολών από τη μύγα της Μεσογείου συνιστώνται σκευάσματα για την ευδεμίδα που έχουν έγκριση αντιμετώπισης και για τη μύγα.

ΠΡΟΣΟΧΗ : Να τηρείτε αυστηρά τους χρόνους αναμονής πριν τη συγκομιδή.

Να επιλέγεται σκευάσματα μικρής υπολειμματικής διάρκειας κοντά στη συγκομιδή.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την [ευδεμίδα πατήστε εδώ](#)

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη [μύγα μεσογείου πατήστε εδώ](#)

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΤΡΥΓΟ

ΣΥΜΠΛΟΚΟ ΪΣΚΑΣ:



Γενικές πληροφορίες - Διαπιστώσεις:

- Συμπτώματα του συμπλόκου της ίσκας παρατηρούνται κάθε χρόνο σε πολλά αμπέλια. Τα προσβεβλημένα πρέμνα επισημαίνονται εύκολα την περίοδο αυτή καθώς παρουσιάζουν χαρακτηριστικά συμπτώματα όπως:
 - Μεταχρωματισμό φύλλων (χρώμα κεραμιδι και εμφάνιση τριχρωμίας με καστανή, κίτρινη και πράσινη ζώνη - σύμπτωμα «τίγρης»).
 - Σταδιακή ή απότομη ξήρανση βλαστών και σταφυλιών.
 - Καστανό μεταχρωματισμό του ξύλου σε τομή του βραχίονα.

Οδηγίες:

- Να γίνει η επισήμανση των ύποπτων πρέμνων αυτή την περίοδο.

Ικανοποιητικός έλεγχος της ασθένειας επιτυγχάνεται προληπτικά :

1. με καλλιεργητικά μέτρα που εφαρμόζονται κατά τα χειμερινά κλαδέματα και
2. με επαλείψεις ή ψεκασμούς που γίνονται αμέσως μετά το χειμερινό κλάδεμα, κυρίως στις μεγάλες κλαδοτομές.

Αναλυτικές οδηγίες δίνονται την εποχή των χειμερινών κλαδεμάτων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την [ίσκα πατήστε εδώ](#)

ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ:
(*Plasmopara viticola*)



Περονόσπορος. Όψιμες προσβολές στο φύλλωμα και πρόωρη αποφύλλωση

ΩΙΔΙΟ:
(*Erysiphe necator*)



Ωίδιο. Έντονες προσβολές

Γενικές πληροφορίες - Διαπιστώσεις :

ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ:

- Τη φετινή καλλιεργητική περίοδο, υπήρξαν κατά περιοχές έντονες προσβολές.
- Οι προσβολές περονόσπορου προκαλούν πρόωρη αποφύλλωση, η οποία συνεχίζει να εξελίσσεται όποτε σημειώνονται δροσιές ή βροχές.
- Η πρόωρη απώλεια του φυλλώματος επηρεάζει αρνητικά την ομαλή ξυλοποίηση των κληματίδων, με πιθανές επιπτώσεις στην παραγωγή της επόμενης χρονιάς.
- Παράλληλα, οι φθινοπωρινές προσβολές του φυλλώματος συμβάλλουν στη διατήρηση του μύκητα στο έδαφος για αρκετά χρόνια (3-5).

ΩΙΔΙΟ:

- Οι συνθήκες θερμοκρασίας, υγρασίας, ανέμων που επικράτησαν κατά τη φετινή καλλιεργητική περίοδο ήταν πολύ ευνοϊκές για τον μύκητα με αποτέλεσμα την πολύ υψηλή πίεση προσβολής και την έντονη εμφάνιση συμπτωμάτων.
- Οι έντονες προσβολές του ωιδίου εξασθενούν τη βλάστηση και επηρεάζουν αρνητικά την φυτοϋγεία του αμπελιού και την παραγωγή της επόμενης χρονιάς.

Οδηγίες:

- Για την προστασία του φυλλώματος από όψιμες φθινοπωρινές προσβολές και την ομαλή ξυλοποίηση και ωρίμανση των κληματίδων συνιστάται να γίνει **αντιμετώπιση μετά τον τρύγο :**
- Σε αμπελίες με προσβολές περονόσπορου με τις πρώτες βροχές ή σε περιόδους με έντονες δροσιές, κατά προτίμηση με χαλκούχα σκευάσματα.
- Σε αμπελίες με έντονες προσβολές ωιδίου, κατά προτίμηση με βρέξιμο θείο.
- Σε αμπελίες με προσβολές και από τους δυο μύκητες, συνδυασμένη επέμβαση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον [περονόσπορο εδώ](#)

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το [ωίδιο πατήστε εδώ](#)

Φυτοπροστατευτικά προϊόντα (ΦΠΠ) : Εγκεκριμένα σκευάσματα στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ [πατώντας εδώ](#)

Συνιστάται να επιλέγετε σκευάσματα με τους λιγότερους κινδύνους για τον χρήστη και το περιβάλλον. Τα φυτοπροστατευτικά δεν είναι ακίνδυνα.

Θυμηθείτε πριν την εφαρμογή να ελέγχετε τη σήμανση κινδύνου και να παίρνετε απαραίτητως μέτρα προστασίας.

Σε κάθε περίπτωση διαβάστε προσεκτικά και εφαρμόζετε πιστά την ετικέτα.



Ηράκλειο 4 Σεπτεμβρίου 2026
Η Προϊσταμένη Τμήματος
Κληρονόμου Ευφροσύνη

Τα Δελτία Γεωργικών Προειδοποιήσεων αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου	
Τα δελτία γεωργικών προειδοποιήσεων αμπελιού αποστέλλονται στο email κάθε ενδιαφερόμενου με εγγραφή πατώντας εδώ	
Εφαρμογή I-Agric του ΥπΑΑΤ για ενημερώσεις στο κινητό τηλέφωνο	